N°. 71

Description D'un Lipôme au bras.

par Monsieur Deyrit.

une femme, agée de soixante-dix-huit ans, portoit Le Long De la partie posterieur du Bras, une tumeur qui avoit Dix-sept pouces De Longueur, vingt-huit De circonference a sa partie superieur et vingt-sept a L'inferieur, voyez La 1ere figure.

Cette tumeur pesoit trente-huit Livres.

on ne s'etoit point apercue De son commencement; ce ne fut que Lorsquelle augmenta qu'on Reconnut quelle avoit prit naissance a La partie moyenne et externe du bras, dant Les cellules De La membrane Graisseuse qui se trouve entre Les muscles extenseurs de L'avant-bras.

Comme toutes Les tumeurs Graisseuses, elle etoit insensible au touché et sans changemens de couleurs a La peau.

je separai le Bras du cadavre, après avoir pris toutes Les Dimensions De La tumeur, et j'injectai L'artere axillaire afin De m'assurer s'il n'y avoit pas De tumeur anevrismale.

L'injection, quoique Grossiere et en petite quantité

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 42 n° 86

Donnat a merveille et parcouroit nombre de
Rameaux collateraux, ce qui prouve qu'il n'y
avoit point de Dilatation dans sa Route.

j'enlevai Les tegumens qui couvroient toutes
L'etendue de La tumeur, et la Laissai
attaché a La partie superieure de L'avant-Bras
ou elle avoit Des adherences a L'aponevrose des
extenseurs et a La membrane comune Des
muscles. je Dissequai pour connoitre ces
Derniers, et je trouvai Le muscle Grand pectoral
dans son etat naturel; Le Biceps tendu; sa
Longue tête, c'est a dire, celle qui s'attache
a La partie superieure de La cavités Glenoide,
fournissant des fibres charnues, Rayonnées, confondues
avec D'autres du coraco-Brachial, et faisant une
expension musculeuse qui couvroit une Grande
partie De La tumeur du coté interne. Le
Deltoide fournissoit, près De son attache a L'os,
Des plans charnues, qui joints a D'autres Des
extenseurs, couvroient une partie De La tumeur
Du coté externe et se terminoient a L'olecrâne
en se confondant avec L'aponevrose du
triceps Brachial. enfin je trouvai que Le
muscle Long extenseur fournissoit, a La
tumeur, une bande musculeuse qui embrassoit

toute sa circonference posterieur en formant une echarpe qui se terminoit a l'olecrâne comme il est designé dans la deuxieme figure.

Toutes ces envelloppes enlevées, j'apperceu que la tumeur se separoit en deux principaux Lobes joints l'un a l'autre par des productions celluleuses et par des Rameaux d'arteres qui Les parcouroient ~~tous deux~~ ~~l'un et l'autre~~. ces cellules me parurent etre une continuité de l'envelloppe propre. ayant ecarté ces Lobes, j'en apperçu un troisieme qui separoit les précedens. voyez la figure troisieme.

je mis macerer la tumeur dans une Dissolution d'alun; il se fit un fonte dans les Differens lobes ce qui me portat a y faire Des incisions par ou il sortit une Grande quantité de matiere huileuse tenant de la nature de la Graisse.

je pense que la cause de cette tumeur c'est un suc Graisseux une Lymphe visqueuse arreté dans quelques vaisseaux qui se sont Distendus insensiblement: car de même que les vaisseaux sanguins se Dilatent quant il se forment Des anevrismes ou des varices; de même

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
BIBLIOTHÈQUE

Lorsque La Graisse trouve quelques obstacles dans son mouvement progressif, elle abreuve par son sejour, Les fibres du conduit obstrué, Les Relâches et Les Rends propres a Recevoir beaucoup de sucs qui s'epaississent et forment une tumeur dont Les vaisseaux Lymphatiques et Graisseux sont confondus.

je pense aussi que cette maladie n'a causé que très peu de Douleur dans son commencement, et que La malade ne s'est fait administrer aucun Remedes, car ses parens m'ont assuré qu'ils ne s'apperceurent De cette tumeur que Lorsqu'elle etoit Deja volumineuse.